

ENDO AJACCIO

Dr Antoine FELIX - Chirurgien Dentiste - Pratique exclusive de l'endodontie

RECOMMANDATIONS POST-TRAITEMENT

Vous venez de recevoir un **traitement endodontique**. Ce traitement a pour objectif de désinfecter la ou les racines de la dent concernée. A la suite de cette intervention, il est normal d'avoir des **sensibilités** pendant les jours qui suivent.

1

Veillez attendre que l'effet de l'anesthésie disparaisse avant de manger, afin d'éviter les morsures de lèvres.



2

Une **sensibilité à la mastication** peut se manifester, il s'agit d'une réaction **normale et transitoire** qui ne doit pas vous inquiéter. Si ces sensibilités surviennent, prenez des anti-douleurs.

Adultes : *Paracétamol 1gr maximum 4x/jours.*



3

Il arrive de manière occasionnelle qu'un **gonflement** survienne dans les jours qui suivent le traitement. Si cela se produit il est important de **nous contacter** afin que nous puissions juger si des antibiotiques sont nécessaires.

4

Il est primordial de ne pas rester longtemps avec l'**obturation provisoire**. Après le traitement, notre pansement doit-être **remplacé au plus vite** par **votre dentiste** de façon à ne pas compromettre la pérennité du traitement.

Au delà de trois semaines des re-contaminations sont possible.



Un rendez-vous de **contrôle guérison** est prévu dans un an.



Pour toutes informations ou demandes complémentaires vous pouvez nous joindre